

2007年3月

鶴原製薬株式会社

アイデイトロール10 使用上の注意改訂のお知らせ

拝啓、時下益々ご清祥の段お慶び申し上げます。

平素は弊社製品に対し格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

この度、アイデイトロール10の使用上の注意を下記のとおり自主改訂致しましたのでご連絡申し上げます。

今後のご使用に際しましては、新しい〔使用上の注意〕をご参照下さいますようお願い申し上げます。

敬具

記

「(3)相互作用の2)併用注意」の項の「アルコール」に関する部分を下記のとおり改訂致します。(_____ : 変更箇所)

改 訂 後			改 訂 前		
2) 併用注意 (併用に注意すること)			2) 併用注意 (併用に注意すること)		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
アルコール	本剤の血中濃度の変動により、作用が減弱または増強する可能性があるため注意すること。	アルコールにより本剤の吸収、代謝が変動するためと考えられている。	アルコール	本剤の血中濃度が低下し、作用が減弱する可能性があるため注意すること。	アルコールにより肝の酵素が誘導されるため本剤の肝での代謝が促進され、バイオアベイラビリティが低下すると考えられている。

以上