

マゴチロン錠 40mg 使用上の注意改訂のお知らせ

拝啓、時下益々ご清祥の段お慶び申し上げます。

平素は弊社製品に対し格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

この度、弊社製品であるマゴチロン錠 40mg の使用上の注意を下記のとおり自主改訂致しましたのでご連絡申し上げます。

今後のご使用に際しましては、新しい〔使用上の注意〕をご参照下さいますようお願い申し上げます。

敬具

記

◆ 「(3) 相互作用」の項に下記を追加致します。(_____ 部追加)

改 訂 後			改 訂 前		
(3) 相互作用 本剤は主として肝代謝酵素CYP3A4 で代謝される。 <u>また、本剤はP-糖蛋白の基質であるとともに、P-糖蛋白に対して阻害作用を有する。</u> 併用注意（併用に注意すること）			(3) 相互作用 本剤は主として肝代謝酵素 CYP3A4 で代謝される。 併用注意（併用に注意すること）		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
血圧降下剤	【変更なし】		血圧降下剤	【略】	
β遮断剤 ラウオルフィア製剤	【変更なし】		β遮断剤 ラウオルフィア製剤	【略】	
抗不整脈剤 低カリウム血症を起すおそれがある薬剤	【変更なし】		抗不整脈剤 低カリウム血症を起すおそれがある薬剤	【略】	
ジギタリス製剤	【変更なし】		ジギタリス製剤	【略】	
<u>ダビガトランエテキシラートメタン スルホン酸塩</u>	<u>ダビガトランの抗凝固作用が増強することがあるので、</u> <u>ダビガトランエテキシラートの用量調節や投与間隔を考慮するなど、投与方法に十分注意すること。</u>	<u>ダビガトランの血中濃度を上昇させる。</u>	【記載なし】		
【以下 略】					
【以下 略】			【以下 略】		