

2011年8月

鶴原製薬株式会社

## エフェーミック注 使用上の注意改訂のお知らせ

拝啓、時下益々ご清祥の段お慶び申し上げます。

平素は弊社製品に対し格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

この度、弊社製品であるエフェーミック注の使用上の注意を下記のとおり自主改訂致しましたのでご連絡申し上げます。

今後のご使用に際しましては、新しい〔使用上の注意〕をご参照下さいますようお願い申し上げます。

敬具

### 記

◆ 「(5) 適用上の注意」の項を下記のとおり改訂致します。( \_\_\_\_\_部改訂箇所)

改 訂 後	改 訂 前
<p><b>(5) 適用上の注意</b></p> <p>1) <b>静脈内注射時</b>：急速な静脈内投与により、一過性の胸部不快感、血圧低下、<u>房室ブロック</u>を起こすことがあるので、静脈内注射をする場合には、補液で希釈して投与するなど、できるだけゆっくり投与すること。</p> <p>2) <b>筋肉内注射時</b>：筋肉内注射にあたっては、組織、神経等への影響を避けるため、下記の点に注意すること。</p> <p>1. 筋肉内投与はやむを得ない場合にのみ、必要最小限に行うこと。特に同一部位への反復注射は行わないこと。また、低出生体重児、新生児、乳児、幼児、小児は特に注意すること。</p> <p>2. 神経走行部位を避けるよう注意すること。</p> <p>3. 注射針を刺入したとき、激痛を訴えたり、血液の逆流をみた場合は直ちに針を抜き、部位を変えて注射すること。</p> <p>3) <b>アンプルカット時</b>：ワンポイントアンプルには小さな傷の位置を示すため丸印のマークをつけてあるので、アンプルカット直前にエタノールなどでよくふいたのち丸印マークを上にして両側にひっぱるよう下に折り曲げ、カットする。(ヤスリは不要である。)</p>	<p><b>(5) 適用上の注意</b></p> <p>1) <b>静脈内注射時</b>：急速な静脈内投与により、一過性の胸部不快感、血圧低下を起こすことがあるので、静脈内注射をする場合には、補液で希釈して投与するなど、できるだけゆっくり投与すること。</p> <p>2) <b>筋肉内注射時</b>：筋肉内注射にあたっては、組織、神経等への影響を避けるため、下記の点に注意すること。</p> <p>1. 筋肉内投与はやむを得ない場合にのみ、必要最小限に行うこと。特に同一部位への反復注射は行わないこと。また、低出生体重児、新生児、乳児、幼児、小児は特に注意すること。</p> <p>2. 神経走行部位を避けるよう注意すること。</p> <p>3. 注射針を刺入したとき、激痛を訴えたり、血液の逆流をみた場合は直ちに針を抜き、部位を変えて注射すること。</p> <p>3) <b>アンプルカット時</b>：ワンポイントアンプルには小さな傷の位置を示すため丸印のマークをつけてあるので、アンプルカット直前にエタノールなどでよくふいたのち丸印マークを上にして両側にひっぱるよう下に折り曲げ、カットする。(ヤスリは不要である。)</p>

以 上