

ヘマレキート錠 30mg/60mg 使用上の注意変更のお知らせ

拝啓、時下益々ご清祥の段お慶び申し上げます。

平素は弊社製品に対し格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

この度、弊社製品であるヘマレキート錠 30/60mg の使用上の注意を下記のとおり自主改訂致しましたのでご連絡申し上げます。

今後のご使用に際しましては、新しい〔使用上の注意〕をご参照下さいますようお願い申し上げます。

敬具

記

◆「相互作用」の項の概要に関する記述及び併用注意に下記を追加致します。(部追加、 部削除箇所)

併用注意 (併用に注意すること)			併用注意 (併用に注意すること)		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
降圧作用を有する薬剤 (降圧剤、硝酸剤等)	【略】	【略】	降圧作用を有する薬剤 (降圧剤、硝酸剤等)	【略】	【略】
β-遮断剤 (ビソプロロールフマル酸塩、プロプラノロール塩酸塩、アテノロール等)	【略】	【略】	β-遮断剤 (ビソプロロールフマル酸塩、プロプラノロール塩酸塩、アテノロール等)	【略】	【略】
ラウオルフシア製剤(レセルピン等)	【略】	【略】	ラウオルフシア製剤(レセルピン等)	【略】	【略】
ジギタリス製剤 (ジゴキシン、メチルジゴキシン)	【略】	【略】	ジギタリス製剤 (ジゴキシン、メチルジゴキシン)	【略】	【略】
抗不整脈薬 (アミオダロン塩酸塩、メキシレチン塩酸塩等)	【略】	【略】	抗不整脈薬 (アミオダロン塩酸塩、メキシレチン塩酸塩等)	【略】	【略】
フィンゴリモド塩酸塩	フィンゴリモド塩酸塩の投与開始時に併用すると重度の除脈や心ブロックが認められることがある。	共に徐脈や心ブロックを引き起こすおそれがある。	【記載なし】		
アプリンジン塩酸塩	【略】	【略】	アプリンジン塩酸塩 〔抗不整脈薬〕	【略】	【略】
ジヒドロピリジン系 Ca 拮抗剤 (ニフェジピン、アムロジピンベシル酸塩等)	【略】	これら薬剤の代謝酵素(チトクローム P 450)を阻害することにより、これらの薬剤の血中濃度を上昇させると考えられる。	ジヒドロピリジン系 Ca 拮抗剤 (ニフェジピン、アムロジピンベシル酸塩等)	【略】	これら薬剤の代謝酵素(チトクローム P 450)を阻害することにより、これらの薬剤の血中濃度を上昇させると考えられる。
シンバスタチン	シンバスタチンの血中濃度上昇による横紋筋融解症やミオパシーが発現することがある。定期的に臨床症状を観察し、異常が認められた場合には投与を中止する。		【記載なし】		
トリアゾラム	【略】	【略】	トリアゾラム 〔睡眠導入剤〕	【略】	【略】
ミダゾラム	【略】	【略】	ミダゾラム 〔催眠鎮静導入剤〕	【略】	【略】
カルバマゼピン	【略】	【略】	カルバマゼピン 〔向精神作用性てんかん治療剤・躁状態治療剤〕	【略】	【略】
セレギリン塩酸塩	【略】	【略】	セレギリン塩酸塩 〔パーキンソン病治療剤〕	【略】	【略】
テオフィリン	【略】	【略】	テオフィリン 〔気管支拡張剤〕	【略】	【略】
シロスタゾール	【略】	【略】	シロスタゾール 〔抗血小板剤〕	【略】	【略】
ビノレルビン酒石酸塩	【略】	【略】	ビノレルビン酒石酸塩 〔抗悪性腫瘍剤〕	【略】	【略】
シクロスポリン	【略】	【略】	シクロスポリン 〔免疫抑制剤〕	【略】	【略】
タクロリムス水和物	【略】	【略】	タクロリムス水和物 〔免疫抑制剤〕	【略】	【略】
フェニトイン	【略】	【略】	フェニトイン 〔抗てんかん剤〕	【略】	【略】
シメチジン	【略】	【略】	シメチジン 〔H ₂ 受容体拮抗剤〕	【略】	【略】
HIV プロテアーゼ阻害剤 (リトナビル、サキナビルメシル酸塩等)	【略】	【略】	HIV プロテアーゼ阻害剤 (リトナビル、サキナビルメシル酸塩等)	【略】	【略】
リファンピシン	【略】	【略】	リファンピシン 〔結核治療剤〕	【略】	【略】
麻酔剤 (イソフルラン、エンフルラン、ハロタン等)	【略】	【略】	麻酔剤 (イソフルラン、エンフルラン、ハロタン等)	【略】	【略】
筋弛緩剤 (バンクロニウム臭化物、ベクロニウム臭化物等)	【略】	【略】	筋弛緩剤 (バンクロニウム臭化物、ベクロニウム臭化物等)	【略】	【略】

以上