

## リタロクス懸濁用配合顆粒使用上の注意変更のお知らせ

拝啓、時下益々ご清祥の段お慶び申し上げます。

平素は弊社製品に対し格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

この度、弊社製品であるリタロクス懸濁用配合顆粒の使用上の注意を下記のとおり自主改訂致しましたのでご連絡申し上げます。

今後のご使用に際しましては、新しい〔使用上の注意〕をご参照下さいますようお願い申し上げます。

敬具

### 記

◆「その他副作用」の項を下記のとおり改訂致します。( 部改訂)

改訂後		現行	
その他の副作用		その他の副作用	
	頻度不明		頻度不明
過敏症	そう痒、蕁麻疹、血管浮腫	【記載なし】	
消化器	食欲不振、悪心、胃部不快感、便秘、下痢等	消化器	食欲不振、悪心、胃部不快感、便秘、下痢等
代謝異常*	高マグネシウム血症、 <u>低リン酸血症</u> 及びそれに伴うクル病・骨軟化症・ <u>高カルシウム尿症</u>	代謝異常*	高マグネシウム血症、リン酸塩の低下、クル病・骨軟化症（低リン血症性）
長期投与*	アルミニウム脳症、アルミニウム骨症、貧血	長期投与*	アルミニウム脳症、アルミニウム骨症、貧血

◆「妊婦、産婦、授乳婦等への投与 1)」の項を下記のとおり改訂致します。( 部追加)

改訂後	現行
<p>(6) 過量投与</p> <p>症状：通常の患者において予測される症状は下痢、腹痛、嘔吐等であるが、腎障害のある患者では過量投与により、高マグネシウム血症があらわれることがある。</p> <p>処置：大量の過量服用の場合には、胃洗浄ならびにマグネシウム非含有下剤の投与等の適切な処置を行う。</p>	<p>(6) 過量投与</p> <p>症状：通常の患者において予測される症状は下痢であるが、腎障害のある患者では過量投与により、高マグネシウム血症があらわれることがある。</p> <p>処置：大量の過量服用の場合には、胃洗浄ならびにマグネシウム非含有下剤の投与等の適切な処置を行う。</p>

以上