

## トフィソパム細粒 10%「ツルハラ」使用上の注意改訂のお知らせ

拝啓、時下益々ご清祥の段お慶び申し上げます。

平素は弊社製品に対し格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

この度、弊社製品であるトフィソパム細粒 10%「ツルハラ」の使用上の注意を下記のとおり自主改訂致しましたのでご連絡申し上げます。

今後のご使用に際しましては、新しい〔使用上の注意〕をご参照下さいますようお願い申し上げます。

敬具

### 記

◆「その他の副作用」の項を下記のとおり改訂致します。( 部追加、 部削除)

改訂後		現行	
<b>その他の副作用</b> 以下のような副作用があらわれた場合には、症状に応じて適切な処置を行うこと。		<b>その他の副作用</b> 以下のような副作用があらわれた場合には、症状に応じて適切な処置を行うこと。	
	頻度不明		頻度不明
依存性*	薬物依存	依存性*	薬物依存
精神神経系	眠気、めまい・ふらつき、頭痛、不眠、不安、焦燥、抑うつ症状、手足のふるえ、しびれ等	精神神経系	眠気、めまい・ふらつき、頭痛、不眠、不安、焦燥、抑うつ症状、手足のふるえ、しびれ等
消化器	悪心・嘔吐、口渇、食欲不振、便秘、腹痛、下痢等	消化器	悪心・嘔吐、口渇、食欲不振、便秘、腹痛、下痢等
過敏症**	発疹、痒痒感、発熱、顔面浮腫等	過敏症**	発疹、痒痒感、発熱、顔面浮腫等
肝臓	AST(GOT)の上昇、ALT(GPT)の上昇等	肝臓	AST(GOT)の上昇、ALT(GPT)の上昇等
その他	倦怠感、脱力感、動悸、血圧上昇、ほてり、乳房痛、乳汁分泌、月経異常	その他	倦怠感、脱力感、動悸、血圧上昇、ほてり、乳房痛、乳汁分泌、月経異常
*: 他のベンゾジアゼピン系化合物で連用により薬物依存を生ずることが報告されているので、本剤の投与にあたっては観察を十分に行い、用量及び使用期間に注意し慎重に投与すること。		*: 他のベンゾジアゼピン系化合物で大量投与により薬物依存を生ずることが報告されているので、本剤の投与にあたっては観察を十分に行い、用量を超えないよう慎重に投与すること。	
**: このような症状があらわれた場合には投与を中止すること。		**: このような症状があらわれた場合には投与を中止すること。	

なお、弊社ホームページ (<http://www.tsuruhara-seiyaku.co.jp/medical/>) に「ベンゾジアゼピン受容体作動薬適正使用に関するお願い」を掲載致しておりますので、そちらもご参照ください。

以上