

2020年2月

鶴原製薬株式会社

## バルヒディオ配合錠 MD「ツルハラ」 バルヒディオ配合錠 EX「ツルハラ」 使用上の注意改訂のお知らせ

拝啓、時下益々ご清祥の段お慶び申し上げます。

平素は弊社製品に対し格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

この度、弊社製品であるバルヒディオ配合錠 MD/EX「ツルハラ」の使用上の注意を下記のとおり自主改訂致しましたのでご連絡申し上げます。

今後のご使用に際しましては、新しい〔使用上の注意〕をご参照下さいますようお願い申し上げます。

敬具

### 記

- ◆ 「その他の注意」の項を新設し下記を記載致します。

改訂後	現行
(11) <u>その他の注意</u> <u>海外で実施された疫学研究において、ヒドロクロロチアジドを投与された患者で、基底細胞癌及び有棘細胞癌のリスクが増加することが報告されている</u> 1) 2)。	【現行記載なし】

- ◆ 「主要文献」の項に下記を追加致します。

改訂後	現行
1) Pottgard, A. et ai. : J. Intern. Med. 282, 322-331(2017) 2) Pedersen, SA. et al.J. Am. Acad. Dermatol. 78,673-681(2018)  現行の1)～6)を3)～8)と致します。	【現行記載なし】

以上