

使用上の注意改訂のお知らせ

ロスバスタチン錠2.5mg「ツルハラ」 ロスバスタチン錠5mg「ツルハラ」

この度、下記のとおり使用上の注意を改訂致しましたので、お知らせ申し上げます。
今後のご使用に際しましては、下記の内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

◆改訂内容（下線部を追加）

改訂後			現行		
10. 相互作用 10.2 併用注意(併用に注意すること)			10. 相互作用 10.2 併用注意(併用に注意すること)		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
マクロライド系抗生物質 エリスロマイシン等	(略)	(略)	マクロライド系抗生物質 エリスロマイシン等	(略)	(略)
チカグレロル	本剤の血漿中濃度上昇により横紋筋融解症やミオパチーのリスクが増加するおそれがある。	チカグレロルがBCRPを阻害することにより本剤の排出が阻害され、本剤の血漿中濃度が上昇する可能性がある ^{1),2)} 。	クマリン系抗凝固剤 ワルファリン	(略)	(略)
クマリン系抗凝固剤 ワルファリン	(略)	(略)			
23. 主要文献			23. 主要文献		
1) Lehtisalo M. et al. Br J Clin Pharmacol. 2023;89(7):2309-15			1) Zurth C, et al.: Eur J Drug Metab Pharmacokinet. 2019;44(6):747-59		
2) Lehtisalo M. et al. Clin Pharmacol Ther. 2024;115(1):71-9			2) 略		
3) Zurth C, et al.: Eur J Drug Metab Pharmacokinet. 2019;44(6):747-59					
4) 略（以下、番号繰下げ）					

◆改訂理由

CCDS（Company Core Data Sheet）が変更されたため、自主改訂を行いました。

【電子化された添付文書（電子添文）の閲覧について】

製品の外箱等に記載されたGS1バーコードを専用のアプリケーション（添文ナビ）で読み取ることで、独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）のホームページより本製品の最新の電子化された添付文書をご覧頂けます。

また、電子化された添付文書については、弊社ホームページ（<http://www.tsuruhara-seiyaku.co.jp/medical/>）からも閲覧、印刷頂けます。

紙媒体の添付文書をご希望される場合は、お手数をお掛け致しますが、弊社MR又は弊社問合せ先までご連絡ください。

専用のアプリケーション（添文ナビ）で下記GS1バーコードを読み取ることで、最新の電子添文等をご参照いただけます。



(01) 1 4987271 09255 8



(01) 1 4987271 09265 7

【弊社問合せ先】 鶴原製薬株式会社 医薬情報部 TEL：0120-901-758 受付時間 9：00～17：15（土・日、祝祭日、弊社休業日を除く）